



# ຂ້າພະນັກສູງຊຸມບູນ

“ບຣັກເຣດີ ມີນໍາໄຈ ຂຶ່ວສົດຍີ”

[www.thatoomHSP.com](http://www.thatoomHSP.com)  
Tel.0-4459-1126

ຫຼາຍລຸ່ມຫຼືຕິດຫຼາກແລະປົກລະບົກສູ່ມີພົມອົງ ຮູ.ພ.ທໍາຄູນ

## ໂຮດທ້ອງຮ່ວງໃນເຕັກ ເຮື່ອງນ່າກລັວ ພ່ວມ ອຍ່າມອອງບ້າມ!!!



### ໂຮດທ້ອງຮ່ວງໃນເຕັກ ເນື້ອໄຮ້ເຖິງເຮື່ອງກວ່າທ້ອງຮ່ວງ

ເນື້ອລຸກມີອາກະຊົາໃດໜຶ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃນ 24 ຊມ

- ຄ່າຍເຫລວ ມາກກວ່າ 3 ຄຮັ້ງເຊື້ອໄປ
- ຄ່າຍເປັນນຸກເລື່ອດ (1 ຄຮັ້ງເຊື້ອໄປ)
- ຄ່າຍເປັນນໍ້າປະມານມາກ (1 ຄຮັ້ງເຊື້ອໄປ)

ໄມ່ຮ່ວມຄື້ນເຕັກເລີກທີ່ທ່ານນມແມ່ ຈຶ່ງມັກຈະຄ່າຍບ່ອຍ ແຕ່ອຸຈະຈະເປັນເນື້ອດີ ແລະມີນໍ້າຫັກຕັ້ງໜັກຕ້ອງກວ່າ

### ໂຮດທ້ອງຮ່ວງໃນເຕັກ ມີສາເຫດມາຈາກອະໄຣ

ໃນເຕັກເລີກ ໂດຍເສພາະອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 1-2 ປີ ສ່ວນໃໝ່ເກີດຈາກເຂົ້ອໄວຮັສ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍທາງປາກ ໂດຍການທານ  
ອາຫາຣ໌ອົນມ໌ທີ່ປັນເປື້ອນເຊື້ອໂຮດ ອ້ອກການຫຍົບຂອງເລັ່ນ ອ້ອມື່ອສົກປະກເຂົ້າປາກ ເຕັກຈຶ່ງປ່ວຍບ່ອຍກວ່າຜູ້ໃໝ່  
ເພຣະໄມ່ຮູ້ຈັກປຶ້ອງກັນຕ້ວເວັງ ແລະກຸມືຕ້ານທານຍັງໄມ່ແຂ່ງແຮງ ສາເຫດສ່ວນນ້ອຍຂອງອາການທ້ອງຮ່ວງໃນເຕັກ ເຊັ່ນ  
ການແພັນມວ້າ ກວາະຕ່ອມໄທຮອຍດີທ່າງນາກຝຶດປກຕີ (hyperthyroid) ຜລຈາກໂຮດປະຈຳຕ້ວ ອ້ອຍາທີ່ທ່ານ

## ห้องร่วง หรือห้องเสีย จากการยึดตัว มีจริงไหม

ในทางการแพทย์ การยึดตัวหรือการหัดคลาน หัดยืน หัดเดิน ไม่ได้มีผลกับลำไส้ หรือการขับถ่ายเลยค่ะ แต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กในวัยนี้มักมีอาการห้องร่วง เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบเอาของเข้าปาก คลานไปพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเพิ่มเชื้อโรคเข้าสู่มือ จากนั้นก็อาจมีอเข้าปาก ทำให้ห้องร่วงได้บ่อยกว่าเด็กวัยอื่นๆ ค่ะ ห้องร่วงในเด็กมีอาการแบบไหนที่แม่ๆ ต้องรีบพาไปโรงพยาบาล



- ถ่ายมาก เช่น ถ่ายเป็น 10 ครั้ง ต่อวัน
- อาเจียนมาก หรือไม่ยอมทานอะไรเลย โดยเฉพาะน้ำหรือนม
- ไข้สูง ซัก หรือซึม
- หายใจหอบ
- ถ่ายอุจจาระเป็นมูก หรือเป็นมูกเลือด
- มีอาการของการขาดน้ำ

เนื่องจากห้องร่วงในเด็ก ส่วนใหญ่มักมีการเสียน้ำ ทั้งทางอุจจาระ และทางการอาเจียน ออกทั้งบนทั้งล่าง แบบนี้ ขณะที่เด็กทานได้น้อย น้ำไม่เตะ นมก็ไม่เตะ ยิ่งทำให้ภาวะขาดน้ำรุนแรงขึ้น วิธีสังเกตอาการขาดน้ำและเกลือแร่ ได้แก่

- ปากแห้ง
- ตาโหล
- ปัสสาวะเข้ม หรือออกน้อย โดยเฉพาะถ้าไม่ปัสสาวะเลยนานกว่า 4 ชั่วโมงแล้ว
- ขนาดร่องไห้ ยังไม่มีน้ำตา
- ปกติเป็นเด็กชี้ร้อน แต่วันนี้ยังไม่มีเที่ยวเลย ถ้ามีอาการต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบมาโรงพยาบาลค่ะ

## โรคห้องร่วงในเด็กแม่ๆ ต้องทำการรักษา

หากไม่มีสัญญาณอันตรายดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลอาการห้องร่วงที่บ้านได้ค่ะ



## 1. น้ำเกลือแร่

- สิ่งสำคัญที่สุด คือการขาดเซยน้ำ และเกลือแร่ที่เสียไป โดยการทานน้ำเกลือแร่ ปัจจุบันมีสารละลายเกลือแร่ ORS ขายอยู่ทั่วไป ใช้ 1 ซอง ผสมน้ำสะอาด 1 แก้ว หรือ 1 ขวด (ขนาด 8 ออนซ์)
- อย่าใส่น้ำเกลือแร่ลงในขวดให้ลูกดื่มรวดเดียวจะคงความคลื่นไส้อเจียน ยังทำให้ลูกถ่ายมากกว่าเดิมด้วย เนื่องจากช่วงนี้ลำไส้ยังทำงานผิดปกติ หรือยังดูดซึมไม่ทัน พอดีมน้ำเกลือแร่รวดเดียวจึงถ่ายอกร่วนรวดเดียวเลยเช่นกัน
- การดื่มน้ำเกลือแร่ที่ลูกต้องคือ ควรใช้ช้อนตักป้อนทีละน้อยค่ะ ช่วยลดการอาเจียน และดูดซึมได้ดีกว่า การให้ดูดจากขวดรวดเดียว ในเด็กโตอาจให้จิบจากแก้วทีละน้อยบ่อยๆ แทนได้ค่ะ
- อายุน้อยกว่า 2 ปี ให้ครั้งละ 2-3 ออนซ์ ( $1/4 - 1/2$  แก้วน้ำ) ทุกครั้งที่ถ่าย
- อายุ 2-10 ปี ให้ครั้งละ  $1/2 - 1$  แก้วน้ำ (3-8 ออนซ์) ทุกครั้งที่ถ่าย
- อายุ 10 ปี ขึ้นไป ให้ดื่มปริมาณมากเท่าที่ดื่มได้

## 2. ยา泻่า เชื้อ

การให้ยา泻่า เชื้อควรอยู่ในพิจารณาของแพทย์ค่ะ เนื่องจากห้องร่างในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับยา泻่า เชื้อ นอกจานี้การใช้ยา泻่า เชื้อบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น จำทำให้เชื้อดื้อยา หรือเกิดการแพ้ยา ทำให้อาการห้องร่างรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะ

## 3. ยาหยุดถ่าย

ไม่ควรให้ยาหยุดถ่าย เนื่องจากห้องร่าง เป็นกลไกการกำจัดเชื้อโรคออกจากลำไส้ ดังนั้นเมื่อให้ยาหยุดถ่าย จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและสารพิษจากเชื้อ ทำให้มีการกระจายของเชื้ออ่อนอกลำไส้ได้ ห้องร่างในเด็ก ต้องเปลี่ยนنمใหม่

เด็กห้องร่าง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมุกรายค่ะ เด็กที่ทานนมแม่ให้ทานนมแม่ต่อไป แต่ดูดนบ่อยขึ้น กว่าเดิม ส่วนเด็กที่เลี้ยงด้วยนมผง หากอาการห้องเสียไม่รุนแรง หรือไม่ได้มีข้อบ่งชี้ เช่นติดเชื้อโรคต้า กีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนม ส่วนใหญ่อาการมักดีขึ้นใน 2-3 วัน ค่ะ

บทความโดย: พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ (กุมารแพทย์)



“อุปการพัฒนาฯ ศูนย์บริการฯ”  
รับบริการดูแลดูแลเด็กฯ แบบครบวงจร...คุณภาพ...

[www.thatoomhsp.com](http://www.thatoomhsp.com)

งานจัดการฯ และบริษัทฯ ที่มีประโยชน์ก่อให้เกิด  
โทร.044-591126 ต่อ 116